



CENTRE D'OPHTALMOLOGIE MEDICALE ET CHIRURGICALE
S.C.P. VISIS

8, Espace Méditerranée, 66000 PERPIGNAN, Tél: 04.68.35.92.70
En notre absence et en cas d'urgence, appelez Médipole Ophtalmologie au 04 68 66 10 03 ou 04 68 66 12 34

Perpignan, I
XXX Z

Vitréolyse des Corps Flottants au Laser YAG

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Votre ophtalmologiste vous propose une vitréolyse au laser, c'est-à-dire la fragmentation des corps flottants qui sont responsables de vos troubles visuels.

Le corps vitré est le gel, transparent à l'état normal, qui remplit l'espace situé entre le cristallin et la rétine. Il n'est pas indispensable pour la vision, mais parfois devient inhomogène et entraîne des troubles visuels à type de corps flottants.

La vitréolyse est réalisée en position assise, dans le cabinet médical. Elle est indolore. Après instillation d'une goutte d'anesthésie, votre ophtalmologiste pose un verre sur l'œil. Les impacts lasers vaporisent, fragmentent et déplacent en dehors de l'axe visuel vos corps flottants.

L'alternative au traitement laser est la vitrectomie, chirurgie d'ablation du vitré.

Une à 3 séances de laser sont parfois nécessaires pour éclaircir l'axe visuel. Le temps de traitement n'excédera pas 10-15min par séance. Il n'y a pas de précaution particulière en post-opératoire.

Effets indésirables : Dans les premières heures, vous pourrez ressentir un éblouissement, une vision brouillée.

En post-opératoire, certains signes doivent motiver une consultation en urgence : aggravation brutale du nombre et de la densité des corps flottants, voile noir périphérique se déplaçant vers le centre du champ visuel, baisse de vision, œil rouge et douloureux.

La plupart des procédures laser sont extrêmement sûres mais présentent toutes des risques potentiels, comme toutes les procédures techniques médicales et/ou chirurgicales.

Le traitement par laser a pour risques potentiels : vision floue, augmentation des corps flottants, inflammation et/ou infection oculaire, élévation de la tension intraoculaire, cataracte, déchirure(s) rétinienne(s), hémorragie intra-oculaire, décollement de rétine. Dans le pire des cas (ce qui est rarissime), ces complications peuvent conduire à la cécité ou à la perte de l'œil. Au cours de la séance, chez certaines personnes, un malaise vagal peut se produire.

Votre ophtalmologiste est disposé à répondre à toute question complémentaire que vous souhaiteriez lui poser.

Les dispositions réglementaires font obligation au médecin de prouver qu'il a fourni l'information au patient. Aussi vous demande-t-on de signer ce document dont le double est conservé par votre médecin.

Votre ophtalmologiste est disposé à répondre à toute question complémentaire que vous souhaiteriez lui poser.

Les dispositions réglementaires font obligation au médecin de prouver qu'il a fourni l'information au patient. Aussi vous demande-t-on de signer ce document dont le double est conservé par votre médecin.

Je soussigné(e) reconnais que la nature de l'intervention, ainsi que ses risques, m'ont été expliqués en termes que j'ai compris, et qu'il a été répondu de façon satisfaisante à toutes les questions que j'ai posées.

J'ai reçu une information sur tous les coûts de l'opération

J'ai disposé d'un délai de réflexion suffisant et :

€ donne mon accord pour la réalisation de l'acte qui m'est proposé.

€ ne donne pas mon accord pour la réalisation de l'acte qui m'est proposé.

Date 09/12/2021 et Signature

***Fumer augmente le risque de complications chirurgicales de toute chirurgie.
Arrêter de fumer 6-8 semaines avant l'intervention élimine ce risque supplémentaire.
Si vous fumez, parlez-en à votre médecin, votre chirurgien et votre anesthésiste ou appelez la ligne Tabac-Info-Service au 3989 pour vous aider à réduire les risques et mettre toutes les chances de votre côté.***